

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Tonsilotren tabletes

Atropinum sulfuricum D5, Hepar sulfuris D3,
Kalium bichromicum D4, Silicea D2, Mercurius bijodatus D8

Homeopātiskās zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 4 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Tonsilotren un kādam nolūkam tās lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Tonsilotren lietošanas
3. Kā lietot Tonsilotren
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Tonsilotren
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Tonsilotren un kādam nolūkam tās lieto

Tonsilotren ir homeopātiskās zāles.

Hronisks vai atkārtots akūts tonsilīts (drudzis, rīkles apsārtums, dedzinoša sajūta un mandeļu pietūkums, apgrūtināta rīšana, durošas sāpes, kas izstaro līdz ausīm, kakla limfmezglu pietūkums), palielinātas mandeles (mandeļu hiperplāzija), kā arī kompleksā terapija pēc mandeļu izoperēšanas. Katarālās angīnas gadījumā zāles var lietot kopā ar citiem līdzekļiem kā uzturošo terapiju.

2. Kas Jums jāzina pirms Tonsilotren lietošanas

Nelietojiet Tonsilotren šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret hromu, dzīvsudrabu, jebkuru aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacienti ar vairogdziedzera slimību ir jākonsultējas ar ārstu pirms Tonsilotren lietošanas.

Konsultējieties ar ārstu:

- akūtos gadījumos, ja pēc 4 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk,
- ja rodas papildu sūdzības, piemēram, temperatūra virs 39°C.

Bērni

Nelietot Tonsilotren bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Citas zāles un Tonsilotren

Mijiedarbība ar citām zālēm netika novērota. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis, vai varētu lietot.

Tonsilotren kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Homeopātisku zāļu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi, kā arī stimulatoru lietošana vai dzērieni un tabaka.

Šīs zāles nevajadzētu lietot kopā ar ēdienu un dzērieniem. Zāles jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tonsilotren neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tonsilotren satur laktozi (piena cukuru) un saharozi.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Tonsilotren

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir:

Pieaugušie

Akūtos gadījumos lieto 1 tableti katru stundu (ne vairāk kā 6 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos.
Tālākai ārstēšanai lieto 1–2 tabletes 3 reizes dienā.

Hroniskas vai atkārtotas akūtas saslimšanas gadījumos lieto 1-2 tabletes 3 reizes dienā.

Palielinātu mandeļu gadījumā lieto 1 tableti 3 reizes dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem vecumā no 2 līdz 11 gadiem

Akūtos gadījumos un tālākai ārstēšanai lieto 1 tableti 3 reizes dienā.

Hroniskas vai atkārtotas akūtas saslimšanas vai palielinātu mandeļu gadījumā lieto 1 tableti 3 reizes dienā.

Bērniem vecumā no 12 gadiem

Akūtos gadījumos lieto 1 tableti katru stundu (ne vairāk kā 6 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos.
Tālākai ārstēšanai lieto 1–2 tabletes 3 reizes dienā.

Hroniskas vai atkārtotas akūtas saslimšanas gadījumos lieto 1-2 tabletes 3 reizes dienā.

Palielinātu mandeļu gadījumā lieto 1 tableti 3 reizes dienā.

Visas vecuma grupas

Hroniskas vai atkārtotas akūtas saslimšanas gadījumos terapijas kursu ieteicams atkārtot (vairāki ārstēšanas cikli gadā, katrs 6–8 nedēļas).

Šīs zāles nevajadzētu lietot kopā ar ēdienu un dzērieniem. Atstājiet vismaz pusstundas intervālu. Zāles jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē. Maziem bērniem tabletes var izšķīdināt nelielā ūdens daudzumā.

Ja esat lietojis Tonsilotren vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja esat aizmirsis lietot Tonsilotren

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Tonsilotren

Pārtraucot Tonsilotren lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pēc lietošanas ir iespējama pastiprināta siekalu izdalīšanās. Kalium bichromicum un Mercurius bijodatus aktīvo vielu dēļ ļoti retos gadījumos var izpausties paaugstināta jutības reakcija, tāda kā ādas izsitumi. Šādos gadījumos konsultējieties ar savu ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pastiprināties (sākotnēja homeopātiskā stāvokļa pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet Tonsilotren lietošanu un konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

5. Kā uzglabāt Tonsilotren

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un iepakojuma pēc saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tonsilotren satur

- Aktīvās vielas ir: Atropinum sulfuricum D5 12,5 mg, Hepar sulfuris D3 10 mg, Kalium bichromicum D4 50 mg, Silicea D2 5 mg, Mercurius bijodatus D8 25 mg katrā tabletē (250 mg);
- Citas sastāvdaļas: laktozes monohidrāts, saharoze, magnija stearāts.

Tonsilotren ārējais izskats un iepakojums

Tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, reizēm nedaudz plankumainas, plakanas tabletes. 20 tabletes PVH un alumīnija folijas blisteros, salokāmā kartona kastītē ar pievienotu lietošanas instrukciju. Iepakojumā 40 vai 60 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Alpen Pharma GmbH
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Vācija
Tel +49 7243 200 49 20
e-pasts info.germany@alpenpharma.com

Ražotājs

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2023