

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Neo-angin sūkājamās tabletes

Alcohol 2,4-dichlorobenzylolus, amylmetacresolum, levomentholum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.
- Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Neo-angin un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Neo-angin lietošanas
3. Kā lietot Neo-angin
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Neo-angin
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Neo-angin un kādam nolūkam to lieto

Neo-angin sūkājamās tabletes ir antiseptisks un viegls pretspēju līdzeklis, kas ir piemērots vieglu mutes dobuma un rīkles infekciju profilaksei un efektīvai agrīnai ārstēšanai, samazinot antibiotiku patēriņu. Šo infekciju rezultātā rodas iekaisums ar tādiem simptomiem kā sāpes kaklā, saaukstēšanās, aizsmakums, grūtības norīt. Mandeļu iekaisums (tonsilīts, angīna), mutes dobuma iekaisums (stomatīts, aftozais stomatīts, afta) un rīkles gļotādas iekaisums (faringīts), smaganu iekaisums (gingivīts), balsenes iekaisums (laringīts).

Zāles ir paredzētas lietošanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem vecumā no sešiem gadiem.

Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Neo-angin lietošanas

Nelietojiet Neo-angin šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret dihlorbenzilspirtu, amilmetakrezolu, levomentolu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Neo-angin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Bērni

Nedodiet Neo-angin bērniem līdz 6 gadu vecumam. Lai lietotu Neo-angin, bērniem ir jāspēj kontrolēt tablešu sūkāšanu.

Citas zāles un Neo-angin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Nav zināma ar šīm zālēm saistīta mijiedarbība, lietojot zāles lokāli mutes dobumā.

Neo-angin kopā ar uzturu un dzērienu

Jūs varat lietot šīs zāles jebkurā laikā, neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Dati par aktīvo vielu lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti. Nepietiekamas informācijas dēļ nav iespējams pilnībā izslēgt risku auglim, tādēļ šīs zāles grūtniecības laikā nevajadzētu lietot.

Barošana ar krūti

Informācija par aktīvo vielu /metabolītu izdalīšanos cilvēka pienā nav pietiekama, tāpēc Neo-angin nav ieteicams barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz fertilitāti, nav veikti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Nav ietekmes uz transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu. Atbilstoši pētījumi nav veikti.

Neo-angin satur kumaču 4R (E124), glikozi un saharozi

Neo-angin satur krāsvielu kumaču 4R (E124), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Neo-angin sūkājamā tablete satur 1,14 g glikozes un 1,42 g saharozes, kas atbilst apmēram 10 kcal (42 kilodžouliem). Tas jāņem vērā, ja Jums ir cukura diabēts.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles var saturēt sēra dioksīdu vai sulfītus, kas reti var izraisīt smagas hipersensitivitātes reakcijas un bronhospazmu.

Krāsvielas šajās zālēs satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā sūkājamā tabletē, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3. Kā lietot Neo-angin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva:

Pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem, kas vecāki par 6 gadiem, ieteicams lēni izsūkt vienu tableti katras 2 – 3 stundas. Zāļu maksimālā dienas deva ir 6 sūkājamās tabletes.

Lietošana bērniem

Zāles nav piemērotas bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Neo-angin vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Maksimālā dienas deva ir 6 sūkājāmās tabletes. Pārdozēšanas gadījumā var rasties un pastiprināties aprakstītās nevēlamās blakusparādības. Ja tas notiek, ieteicama simptomātiska ārstēšana.

Ja esat aizmirsis lietot Neo-angin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas kāda no turpmāk minētajām blakusparādībām, pārtrauciet lietot Neo-angin un nekavējoties sazinieties ar ārstu:

Ļoti reti (var rasties mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem): mutes un kuņģa gļotādas kairinājums, piemēram, gremošanas traucējumi, slikta dūša.

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): alerģiskas reakcijas, piemēram, mutes, mēles un lūpu pietūkums, izsitumi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Neo-angin

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Neo-angin satur

- Aktīvās vielas ir 2,4-dihlorbenzilspirts; amilmetakrezols; levomentols. Katra sūkājamā tablete satur 1,20 mg 2,4-dihlorbenzilspirta; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,90 mg levomentola.
- Citas sastāvdaļas ir zvaigžņanīsa ēteriskā eļļa, piparmētras ēteriskā eļļa, saharoze, vīnskābe, glikoze, kumačs 4R (E 124), kas satur nātriju.

Neo-angin ārējais izskats un iepakojums

Neo-angin ir sarkanas, apaļas, viegli caurspīdīgas sūkājamās tabletes. Tabletes ir iepakotas PVH/PVDH/Al blisteros, kas ievietoti kartona kastītē.

Vienā kastītē ir 24 tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Str. 41

12277 Berlin

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2024