

## Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

### Neo-angin bez cukura sūkājamās tabletes

Alcohol 2,4- dichlorobenzylolus, amylmetacresolum, levomentholum

#### **Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.
- Ja pēc 3 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

#### **Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir Neo-angin bez cukura un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Neo-angin bez cukura lietošanas
3. Kā lietot Neo-angin bez cukura
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Neo-angin bez cukura
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

#### **1. Kas ir Neo-angin bez cukura un kādam nolūkam to lieto**

Neo-angin bez cukura ir antiseptisks līdzeklis un viegls pretsāpju līdzeklis, kas piemērots vieglu mutes un rīkles infekciju profilaksei un iedarbīgai agrīnai ārstēšanai, tādējādi samazinot antibiotiku patēriņu. Infekciju izraisītāji rada dažāda veida iekaisumus ar tādiem simptomiem kā iekaisis kakls, aizsmakums, augšējo elpceļu infekcija, saaukstēšanās, angīna, mutes un rīkles gļotādas, kā arī smaganu iekaisums.

#### **2. Kas Jums jāzina pirms Neo-angin bez cukura lietošanas**

##### **Nelietojiet Neo-angin bez cukura šādos gadījumos:**

- ja Jums ir alerģija pret dihlorbenzilspirtu, amilmetakrezolu, levomentolu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jums ir reti sastopama iedzimta fruktozes nepanesība.

##### **Brīdinājumi un piesardzība lietošanā**

- ja Jums ir cukura diabēts, ņemiet vērā, ka zāles satur cukura aizvietošanu - izomaltu.

##### **Citas zāles un Neo-angin bez cukura**

Nav zināma ar šīm zālēm saistīta mijiedarbība, lietojot zāles lokāli mutes dobumā.

##### **Grūtniecība un barošana ar krūti**

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Nav datu par Neo-angin bez cukura iedarbību grūtniecības laikā.

Nepietiekamas informācijas dēļ nav iespējams pilnībā izslēgt augļa attīstības risku, tādēļ grūtniecēm pirms zāļu lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Lietojot šīs zāles grūtniecēm un sievietēm krūts barošanas periodā, jāievēro piesardzība.

##### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Nav ietekmes uz transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

##### **Neo-angin bez cukura satur kumaču 4R (E124) un izomaltu (E953)**

Neo-angin bez cukura sūkājamās tabletes satur krāsvielu kumaču 4R (E124), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Katra Neo-angin bez cukura sūkājamā tablete satur 2,58 g cukura aizvītotāju izomaltu (E953), kas atbilst apmēram 6 kcal (26 kilodžouliem). Jāņem vērā, ja Jums ir cukura diabēts.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Izomalts var izraisīt vieglu caureju veicinošu iedarbību  
Krāsvielas šajās zālēs satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā sūkājamā tabletē, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

### **3. Kā lietot Neo-angin bez cukura**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem, kas vecāki par 6 gadiem, lēni izsūkāt vienu tableti mutē katras 2 – 3 stundas. Zāļu maksimālā dienas deva ir 6 sūkājamās tabletes.

#### **Lietošana bērniem**

Zāles nav piemērotas bērniem līdz 6 gadu vecumam.

#### **Ja esat lietojis neo-angin bez cukura vairāk nekā noteikts**

Maksimālā dienas deva ir 6 sūkājamās tabletes. Teorētiski pārdozēšanas gadījumā ir iespējams mutes un kuņģa gļotādas kairinājums.

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

### **4. Iespējamās blakusparādības**

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Neraugoties uz šo zāļu plašo lietošanu, par negatīvu iedarbību ziņots ļoti reti; novērots tikai mutes un kuņģa gļotādas kairinājums. Teorētiski ir iespējamas arī alerģiskas reakcijas.

#### **Ziņošana par blakusparādībām**

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv). Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

### **5. Kā uzglabāt Neo-angin bez cukura**

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

### Ko Neo-angin bez cukura satur

- Aktīvās vielas ir 2,4-dihlorbenzilspirts; amilmetakrezols ; levomentols. Katra sūkājamā tablete satur 1,20 mg 2,4-dihlorbenzilspirta; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,72 mg levomentola.
- Citas sastāvdaļas ir zvaigžņanīsa ēteriskā eļļa, piparmētras ēteriskā eļļa, izomalts (E953), vīnskābe, kumačs 4R (E 124), kas satur nātriju.

### Neo-angin bez cukura ārējais izskats un iepakojums

Neo-angin bez cukura ir sarkanas, apaļas, viegli caurspīdīgas sūkājamās tabletes. Tabletes ir iepakotas PVH/PVdH alumīnija blisteros, kas ievietoti kartona kastītē. Vienā kastītē ir 24 tabletes.

### Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

#### Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

DIVAPHARMA GmbH  
Motzener Str. 41  
12277 Berlin  
Vācija

#### Ražotājs:

Klosterfrau Berlin GmbH  
Motzener Str. 41  
12277 Berlin  
Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2025