

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Octenidine Klosterfrau 2,6 mg sūkājamās tabletes
Octenidini dihydrochloridum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā, ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi).

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiat farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 4 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Octenidine Klosterfrau un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Octenidine Klosterfrau lietošanas
3. Kā lietot Octenidine Klosterfrau
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Octenidine Klosterfrau
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Octenidine Klosterfrau un kādam nolūkam to lieto

Octenidine Klosterfrau satur aktīvo vielu oktenidīna dihidrohlorīdu. Tas ir antiseptisks līdzeklis, kas ir efektīvs pret patogēniem mikroorganismiem, iznīcinot to šūnu funkcijas.

Octenidine Klosterfrau lieto īslaicīgai papildus mutes un rīkles gļotādas iekaisuma ārstēšanai ar tādiem tipiskiem simptomiem kā sāpes, apsārtums un pietūkums.

Octenidine Klosterfrau paredzēts lietošanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma.

Ja pēc 4 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Octenidine Klosterfrau lietošanas

Nelietojiet Octenidine Klosterfrau šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret oktenidīna dihidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Octenidine Klosterfrau lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tikai īslaicīgai lietošanai.

Nelietojiet šīs zāles ilgāk kā 4 dienas.

Bērni

Octenidine Klosterfrau lietošanas drošums un efektivitāte bērniem vecumā no 0 līdz 11 gadiem vēl nav noteikta.

Citas zāles un Octenidine Klosterfrau

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Zāļu mijiedarbības pētījumi nav veikti.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Pirms Octenidine Klosterfrau lietošanas grūtniecēm jākonsultējas ar ārstu.

Barošana ar krūti

Nav pietiekamas informācijas par oktenidīna dihidrohlorīda izdalīšanos mātes pienā.

Nevar pilnībā izslēgt risku zīdaiņiem. Tādēļ Octenidine Klosterfrau nevajadzētu lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pētījumi par ietekmi uz transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu nav veikti.

Octenidine Klosterfrau satur izomaltu (E953)

Viena sūkājamā tablete satur 2,57 g cukura aizvītojamā izomaltu, kas atbilst apmēram 6 kcal (26kJ). Tas būtu jāņem vērā cukura diabēta slimniekiem. Izomaltam var būt viegla caureju veicinoša iedarbība.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Octenidine Klosterfrau

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicāiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

ja vien nav noteikts citādi, pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem ir jālieto viena sūkājamā tablete ik pēc 2-3 stundām. Maksimālā dienas deva ir 6 sūkājamās tabletes.

Lietošanas veids:

aktīvi un nepārtraukti sūkājiet sūkājamo tableti. Sūkājamā tablete jāpārvieto pa muti līdz tā pilnībā izšķīdusi.

Bez ārsta norādījumiem, nelietot Octenidine Klosterfrau ilgāk par 4 dienām.

Nevēlamās blakusparādības var mazināt lietojot mazāko efektīvo devu iespējami īsāku laiku, kas nepieciešams simptomu kontrolei.

Ja esat lietojis Octenidine Klosterfrau vairāk nekā noteikts

Maz iespējamā pārdozēšanas gadījumā aprakstītās blakusparādības var pastiprināties. Šādā gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar ārstu, lai saņemtu simptomātisku ārstēšanu.

Ja esat aizmirsis lietot Octenidine Klosterfrau

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvītojamā sūkājamo tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautāiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- mutes un kuņģa gļotādas kairinājums, piemēram, disfāģija, sausa mute, dispepsija, slikta dūša un sāpes vēderā;
- mēles krāsas izmaiņas;
- alerģiskas reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši: Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Octenidine Klosterfrau

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Octenidine Klosterfrau satur

- Aktīvā viela ir oktenidīna dihidrohlorīds. Viena sūkājāmā tablete satur 2,6 mg oktenidīna dihidrohlorīda.
- Citas palīgvielas ir izomalts (E 953), vīnskābe, aromatizētājs rūgtuma mazināšanai (satur propilēnglikolu, kafijas ekstraktu un 4-(2,2,3-trimetilciklopentil) butānskābi), zvaigžņu anīsa ēteriskā eļļa, piparmētras ēteriskā eļļa un sukraloze (E 955).

Octenidine Klosterfrau ārējais izskats un iepakojums

Sūkājāmās tabletes ir ziloņkaula krāsā, apaļas un viegli caurspīdīgas.

Octenidine Klosterfrau ir pieejams kartona kastītēs ar 12, 16, 20 vai 24 sūkājāmām tabletēm, kas iepakotas PVH/PVDH un alumīnija folijas blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Cologne

Vācija

Ražotājs

Klosterfrau Berlin GmbH

Motzener Str. 41

12277 Berlin

Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Vācija, Luksemburga: Laryngomedin Octenidin Antisept

Austrija: Octeangin antisept 2,6 mg Pastillen

Beļģija: Octeangin 2,6 mg zuigtabletten/pastilles/Lutschtabletten

Bulgārija, Ungārija, Polija, Rumānija: Octeangin

Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Slovākija: Octenidine Klosterfrau

Horvātija, Slovēnija: Oktenidin Klosterfrau 2,6 mg pastile

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2025